

IZERVAY es la opción más recetada
para pacientes que inician tratamiento
para la atrofia geográfica (AG)*

izervay[®]
(avacincaptad pegol
intravitreal solution) 2 mg



*Según datos de Symphony del 3/24 al 12/25. Puede no ser representativo de toda la población de pacientes.

ENLENTEZCA LA AG

con **IZERVAY**

Se ha demostrado que IZERVAY enlentece la progresión de la atrofia geográfica, lo que podría ayudar a conservar su visión por más tiempo



Para escuchar una versión en audio de este folleto, llame al 1-855-IZERVAY (1-855-493-7829)

IZERVAY se evaluó en 2 ensayos clínicos con 624 personas con AG y demostró enlentecer considerablemente la progresión de la enfermedad entre un 18 % y un 35 % en las personas que recibieron tratamiento, frente a aquellas que no lo recibieron.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE Y USO

NO use IZERVAY[®] (solución intravítrea de avacincaptad pegol) si:

- tiene una infección en o alrededor del ojo
- tiene una inflamación activa en o alrededor del ojo, que puede incluir dolor y enrojecimiento

Consulte la Información de seguridad importante a lo largo de este folleto.
Haga clic aquí para obtener información de prescripción médica completa.




Algunas personas con síntomas de AG avanzada pierden la capacidad de conducir vehículos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINUACIÓN)

IZERVAY puede causar efectos secundarios graves, como:

- **Infección ocular y desprendimiento de retina.** Las inyecciones para los ojos, como la de IZERVAY, pueden causar una infección ocular (endoftalmitis) o la separación de las capas de la retina (desprendimiento de retina).
- **Degeneración macular relacionada con la edad de tipo húmeda.** Existe el riesgo de desarrollar degeneración macular relacionada con la edad (DMRE) de tipo húmeda con IZERVAY. Informe cualquier síntoma que tenga (distorsiones visuales, como ver líneas rectas torcidas; deterioro de la visión; manchas oscuras; pérdida de la visión central) para que el profesional de la salud le haga seguimiento.

COMIENCE SU TRATAMIENTO PARA LA AG



Representación de actores

Sabemos que convivir con atrofia geográfica (AG) puede ser un desafío, especialmente por los cambios en la visión que esta enfermedad puede provocar. Es natural que tenga muchas dudas sobre su diagnóstico y que se pregunte cuál es la mejor manera de seguir adelante **para continuar haciendo lo que le gusta por más tiempo.**

En este folleto podrá:

- Entender qué es la AG
- Escuchar testimonios reales de personas que viven con AG
- Conocer cómo puede enlentecer la AG con IZERVAY y así conservar la visión por más tiempo

Los pacientes coinciden: es momento de tratar la AG

En una encuesta, el **96 %** de las personas que actualmente reciben tratamiento para la AG afirmó que animaría a otras a comenzar lo antes posible.*

**Siga leyendo para comenzar con confianza
su tratamiento para la AG**

*Resultados de una encuesta patrocinada por Astellas, realizada a 101 personas que reportaron tener AG y que actualmente reciben tratamiento. Datos al mes de septiembre de 2025. Los participantes recibieron una compensación por su tiempo.

Consulte la Información de seguridad importante a lo largo de este folleto. [Haga clic aquí](#) para obtener información de prescripción médica completa.

izervay[®]
(avacincaptad pegol
intravitreal solution) 2 mg



Representación de actores

USTED NO ESTÁ SOLO

Recibir un diagnóstico de atrofia geográfica puede hacer que se sienta aislado, pero en los EE. UU. alrededor de 1.5 millones de personas viven con esta afección.



“Al principio tenía muchas dudas sobre la AG. Deseaba con todas mis fuerzas conservar mi visión por más tiempo, y habría sido muy importante para mí saber que otras personas estaban pasando por la misma situación.”

– Gail, paciente real con AG

Las citas reflejan las experiencias de los pacientes al momento de la publicación.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINUACIÓN)


IZERVAY puede causar efectos secundarios graves: (continuación)

- **Aumento de la presión ocular.** IZERVAY puede causar un aumento temporal de la presión ocular después de la inyección. El profesional de la salud lo monitoreará después de cada inyección.

LA AG ES UNA FORMA AVANZADA DE DMRE SECA

La AG provoca que las células de la retina mueran, lo que también se conoce como atrofia. Esto genera parches de células muertas llamados lesiones que causan la pérdida de la visión.

VISTA LATERAL DEL OJO



| Retina

Detecta la luz y la convierte en señales que el cerebro transforma en imágenes.

| Mácula

Es el centro de la retina que ayuda a percibir detalles.

| Fóvea

Es la responsable de que la visión sea más nítida y clara.

La AG es una condición grave que
conduce a la pérdida irreversible de la visión

DMRE = degeneración macular relacionada con la edad

Consulte la Información de seguridad importante a lo largo de este folleto. [Haga clic aquí](#) para obtener información de prescripción médica completa.

izervay[®]
(avacincaptad pegol
intravitreal solution) 2 mg

RECONOZCA LOS SÍNTOMAS ASOCIADOS CON LA AG


Si los cambios que experimenta en su visión están afectando su vida cotidiana, puede ser una señal de que la AG está progresando. ¿Está experimentando alguno de estos síntomas?



Ve las líneas rectas como onduladas



Ver de noche le resulta más difícil



Ve manchas borrosas que oscurecen la visión central



Ve las palabras borrosas y los colores descoloridos

Cada persona experimenta los síntomas de la AG de forma diferente. Estas imágenes se incluyen con fines ilustrativos y no deben tomarse como asesoramiento médico. Hable con su médico si experimenta alguno o varios de estos síntomas.

**La AG puede estar progresando,
incluso si sus síntomas parecen leves
o si actualmente no tiene ningún síntoma**

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINUACIÓN)

IZERVAY puede causar efectos secundarios graves: (continuación)

Llame de inmediato al profesional de la salud que lo atiende si tiene enrojecimiento en el ojo, dolor en el ojo, aumento del malestar, enrojecimiento en el ojo que empeora, visión borrosa o disminución de la visión, aumento en la cantidad de pequeñas machas flotantes en la visión, destellos de luz o mayor fotosensibilidad.

LA AG PUEDE AFECTAR SU ESTILO DE VIDA Y SU RUTINA DIARIA

La AG puede avanzar más rápido de lo que imagina y empezar a afectar su estilo de vida y su independencia



67 %

de las personas con
AG en ambos ojos
perdieron la capacidad
de conducir un vehículo
en 1.6 años*



~2 de cada 3

pacientes tienen
dificultades para realizar
tareas del hogar, como
limpiar la casa a fondo
o preparar comidas más
elaboradas, de forma
independiente†

Iniciar el tratamiento tan pronto como se le
diagnostique AG puede ayudar a enlentecer
la progresión de la enfermedad y
a conservar la visión por más tiempo

*Análisis de una base de datos de registros médicos electrónicos del Reino Unido, que incluye 1901 pacientes con atrofia geográfica bilateral (AG en ambos ojos). 1.6 años representa la mediana (rango intercuartílico: 0.7-2.7 años).

†Estos datos de la encuesta MOSAIC incluyen los resultados de 102 pacientes de EE. UU., de 60 años o más, que reportaron un diagnóstico de AG en al menos un ojo.


Consulte la Información de seguridad importante a lo largo de este folleto. [Haga clic aquí](#) para obtener información de prescripción médica completa.

izervay[®]
(avacincaptad pegol
intravitreal solution) 2 mg

LA AG PUEDE PROGRESAR DE MANERA IMPREDECIBLE Y MÁS RÁPIDO DE LO QUE CREE

En tan solo 2.5 años, la AG puede extenderse a la fovea, donde la visión es más nítida y clara*†

VISTA POSTERIOR DEL OJO



Quiero conservar mi visión el mayor tiempo posible y sentía una gran urgencia por encontrar un tratamiento que me ayudara a enlentecer la progresión de la AG.”

– Ken, paciente real con AG

*Tiempo mediano que transcurrió desde el diagnóstico en un análisis de 181 pacientes con AG.

†La progresión de la AG es distinta para cada persona. Algunas personas pueden experimentar una progresión más lenta o más rápida, así como cambios en la visión.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINUACIÓN)

Antes de recibir IZERVAY, informe al profesional de la salud que lo atiende acerca de las siguientes condiciones médicas:


- Si tiene antecedentes de ver destellos de luz o pequeñas manchas flotantes en la visión y si estas manchas aumentan repentinamente de tamaño y número.

¿CÓMO ACTÚA IZERVAY?

En personas con atrofia geográfica, una parte del sistema inmune se vuelve **hiperactivo**.



Cuando esto ocurre, las proteínas del sistema inmune presentes en el ojo empiezan a atacar las células sanas de la retina.



Solo IZERVAY inhibe una proteína del sistema inmune llamada C5 para ayudar a proteger las células sanas de la retina.



Enfrente el manejo de su AG con mayor confianza:
hable con su especialista en retina* para
iniciar el tratamiento hoy mismo

*Los especialistas en retina son médicos altamente capacitados en el tratamiento de condiciones que afectan la retina.


Consulte la Información de seguridad importante a lo largo de este folleto. [Haga clic aquí](#) para obtener información de prescripción médica completa.

izervay[®]
(avacincaptad pegol
intravitreal solution) 2 mg

PROTEJA LAS CÉLULAS SANAS DE LA RETINA POR MÁS TIEMPO CON IZERVAY

Se ha demostrado que IZERVAY enlentece la progresión de la AG, lo que podría ayudar a conservar su visión por más tiempo

IZERVAY se evaluó en 2 ensayos clínicos con 624 personas con AG y demostró enlentecer considerablemente la progresión de la enfermedad entre un 18 % y un 35 % en las personas que recibieron tratamiento, frente a aquellas que no lo recibieron.



**Protección de las células sanas de la retina
en solo 1 año de tratamiento**

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINUACIÓN)

Antes de recibir IZERVAY, informe al profesional de la salud que lo atiende acerca de las siguientes condiciones médicas: (continuación)

- Si tiene presión alta en el ojo o glaucoma.
- Si está embarazada o amamantando, cree que puede estarlo o si planea quedar embarazada. De ser así, consulte al médico antes de utilizar este medicamento.
- Si está tomando medicamentos, incluidos medicamentos de venta bajo receta, de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Informe al profesional de la salud acerca de cualquier medicamento que tome.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

**IZERVAY fue bien tolerado en 2 ensayos clínicos.
Entre los efectos secundarios más comunes se incluyen:**

Sangre en la parte blanca del ojo

DMRE húmeda

Visión borrosa*

Leve irritación en la córnea

Aumento de la presión ocular

Dolor en el ojo

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de IZERVAY. Hable con su médico si cree que puede estar experimentando efectos secundarios.

*Visión borrosa incluye deficiencia visual o pérdida de nitidez o de la capacidad de percibir detalles a distancia.

Consulte la Información de seguridad importante a lo largo de este folleto. [Haga clic aquí](#) para obtener información de prescripción médica completa.


izervay[®]
(avacincaptad pegol
intravitreal solution) 2 mg

INICIO DEL TRATAMIENTO CON IZERVAY

IZERVAY es una inyección para los ojos que el médico administra en su consultorio. Esto es lo que puede esperar:



Antes

El médico le limpiará y le adormecerá el ojo para reducir cualquier molestia.



Durante

La aplicación de la inyección suele durar unos segundos. Es posible que sienta presión en el ojo, pero generalmente sin dolor o con un dolor muy leve.



Después

Es posible que experimente enrojecimiento de los ojos, visión borrosa o un aumento de la presión ocular.

Es importante que siga las instrucciones de su médico para el cuidado posterior al tratamiento y que lo llame de inmediato si cree que podría estar experimentando efectos secundarios.

Para obtener el máximo beneficio de IZERVAY, es importante que siga las recomendaciones de tratamiento continuado de su médico.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINUACIÓN)

¿Qué debo evitar durante el tratamiento con IZERVAY?

- Es posible que su visión se vea afectada después de recibir una inyección para los ojos o después de realizarse un examen ocular. No conduzca ni utilice maquinaria hasta que su visión se haya recuperado lo suficiente.



IZERVAY MY WAY

PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA



Si necesita ayuda con el costo de IZERVAY, el programa IZERVAY My WaySM puede ayudarlo.

Nuestro programa de apoyo al paciente está diseñado para satisfacer las necesidades específicas de los pacientes elegibles. Hay ayuda disponible sin importar el tipo de cobertura que tenga, ya sea de un seguro comercial, un seguro que no cubre IZERVAY, no tenga seguro o tenga un seguro emitido por el gobierno (como Medicare).

Hable con su médico para verificar si es elegible para el programa de asistencia financiera de IZERVAY o llame al 1-888-C5MYWAY (1-888-256-9929).



Consulte la Información de seguridad importante a lo largo de este folleto. [Haga clic aquí](#) para obtener información de prescripción médica completa.



CONÉCTESE CON MENTORES Y SERES QUERIDOS



Hable directamente con un paciente o con un mentor cuidador sobre qué puede esperar del programa 1-on-1 Connections de IZERVAY.

Escanee este código QR para registrarse o visite **IZERVAY.com/get-a-mentor**

Los mentores del programa 1-on-1 Connections de IZERVAY reciben una compensación por su tiempo.

Apóyese en sus seres queridos

Su red de apoyo puede ser quien primero note cambios en su salud mental o identifique si necesita apoyo adicional.



Busque a alguien con quien hablar sobre la [AG], además de su médico...alguien que se preocupe por su salud mental. Si no cuenta con alguien así, busque una red de apoyo.”

– Jan, paciente real con AG

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINUACIÓN)

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de IZERVAY?

- Sangre en la parte blanca del ojo
- DMRE húmeda
- Visión borrosa
- Leve irritación en la córnea
- Aumento de la presión ocular
- Dolor en el ojo

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de IZERVAY. Hable con el profesional de la salud que lo atiende sobre cualquier efecto secundario que le moleste o que no desaparezca.



RECURSOS PARA PACIENTES **ORGANIZACIONES DE APOYO Y COMUNITARIAS**

Conozca estas organizaciones para encontrar apoyo, comunidad y recursos educativos sobre la AG.



**Macular
Degeneration**

[**maculardegeneration.net**](http://maculardegeneration.net)



**Lighthouse
Guild**

[**lighthouseguild.org**](http://lighthouseguild.org)



**Prevent
Blindness**

[**preventblindness.org**](http://preventblindness.org)



**BrightFocus®
Foundation**

Cure in Mind. Cure in Sight.

[**brightfocus.org**](http://brightfocus.org)

**FOUNDATION
FIGHTING
BLINDNESS**

[**fightingblindness.org**](http://fightingblindness.org)

Astellas no está afiliada ni respalda a ninguna de estas organizaciones. La información que proporciona Astellas es solo para fines informativos y no pretende sustituir el consejo de un profesional de la salud.

Consulte la Información de seguridad importante a lo largo de este folleto. [Haga clic aquí](#) para obtener información de prescripción médica completa.



ELIJA IZERVAY PARA ENLENTECER LA AG Y AYUDAR A CONSERVAR LA VISIÓN POR MÁS TIEMPO

**Actúe hoy para poder seguir haciendo lo que le gusta
por más tiempo.**

Visite
IZERVAY.com



Visite **IZERVAY.com/patient-stories**
para escuchar a pacientes como usted

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

Llame al profesional de la salud que lo atiende para recibir asesoramiento médico sobre efectos secundarios. Se recomienda informar a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) sobre cualquier efecto secundario negativo de los medicamentos de venta bajo receta. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

¿Qué es IZERVAY?

IZERVAY es una inyección para los ojos de venta bajo receta utilizada para tratar la atrofia geográfica (AG), la forma avanzada de la degeneración macular relacionada con la edad (DMRE) de tipo seca.

Consulte la Información de seguridad importante a lo largo de este folleto. [Haga clic aquí](#) para obtener información de prescripción médica completa.



Copyright © 2026 Astellas Pharma Inc. o sus afiliadas.
Todas las marcas comerciales son propiedad de sus
respectivos dueños. MAT-US-IZE-2026-00369 03/26

izervay[®]
(avacincaptad pegol
intravitreal solution) 2 mg